

Levetiracetam



- A.** Regelmäßige Einnahme
- D.** Ein- u. ausschleichend. **Monoth. bei Erw. u. Jgl. ab 16 J.:** Initial 2 x tgl. 250 mg, Steigerung nach 2 Wo. auf 2 x tgl. 500 mg, max. 2 x tgl. 1500 mg. **Zusatzth. bei Erw. u. Jgl. (12-17 J.) ab 50 kg KG:** Initial 2 x tgl. 500 mg, Steigerung alle 2-4 Wo. mgl., max. 2 x tgl. 1500 mg.
Kdr. u. Sgl. ab 1 Mon.: ► Fachinfo
Bei Nierenfunktionsstör. ► Fachinfo. Auch bei schwerer Leberfunktionsstör. zunächst Nierenfunktion prüfen, um d. Dosierung festzulegen.
- H.** Leicht erhöhtes Risiko für suizidales Verhalten. Für Frauen im gebärfähigen Alter ohne wirksame Kontrazeption nicht empfohlen.
- KI.** Unbedenklichkeit/Wirksamkeit bei Kdr. u. Jgl. unter 16 J. als Monoth. nicht nachgewiesen.
- NW.** Nasopharyngitis (sh), Somnolenz u. Kopfschmerzen (sh), Schwindel u. Tremor (h), psychische Stör. (h), Husten (h), M/D-Beschw. u. Anorexie (h), Exanthem (h)
- WW.** Macrogol (L,↓ - Abstand von 1 h vor o. nach der Einnahme von L. einhalten)