

---

**Rotigotin**

---



- A.** Pflaster auf eine saubere, trockene u. unverletzte Hautpartie auftragen. Pflaster nicht zerschneiden. Der Pflasterbereich sollte keiner äußeren Wärme ausgesetzt sein.
- D.** Initial 1 x tgl. 1 Pflaster zu 1 mg, schrittweise Steigerung in wöchentlichen Abständen bis auf 1 x tgl. 1 Pflaster zu 3 mg. Pflaster möglichst zur gleichen Tageszeit anwenden. Ein- u. ausschleichende Do▶
- H.** Überwachung d. Blutdrucks bes. zu Th.-Beginn. Plötzliche Schlafattacken mgl.; Frauen im gebärfähigen Alter müssen eine zuverlässige Kontrazeption anwenden.
- KI.** Magnetresonanztomografie, Kardioversion, keine Erfahr. b. Kdr. u. Jgl.
- NW.** Übelkeit (sh) u. w. M/D-Beschw. (h), Reaktionen an d. Applikationsstelle (sh), Kopfschmerzen (sh), Somnolenz u. Schlafattacken (h), psychiatr. Stör. (h), Impulskontrollstör. (h), periphere Ödeme (h), Juckreiz (h), Überempfindlichkeit - auch Angioödem- (h)
- WW.** Alkohol u. Sedativa u. zentraldämpfende AM (additive W. mgl.), Neuroleptika - z.B. Phenothiazine, Butyrophenone - u. Metoclopramid (R.↓)