

Delta-9-Tetrahydrocannabinol(THC)/Cannabidiol(CBD) 1

Delta-9-Tetrahydrocannabinol(THC)/Cannabidiol(CBD)**Antispastikum, Mittel bei Multipler Sklerose**

- A.** Spray nur zur Anwendung in d. Mundhöhle. An jeweils verschiedenen Stellen d. Mundhöhlenbereichs anwenden. In Verbindung zu d. Mahlzeiten möglichst standardisiert anwenden (Wirkungsschwankungen mgl.).
- D.** Individuell, initial abends 1 Sprühstoß zu 2, 7 THC/2,5mg CBD, schrittweise Erhöhung bis zu morgens 5 Sprühstößen und abends 7 Sprühstößen . Max. 12ED. Zwischen den ED mind. 15min Abstand halten. Ausschleichend dosieren.
- H.** Nur als Komedikation. Optimale Dos. ggf. erst nach 1 Wo. erreicht. Sturzrisiko. Bei Langzeitanwendung Mundschleimhaut untersuchen. Bei Auslandsreisen rechtl. Status d. AM prüfen. Enthält Alkohol.
- KI.** Kdr. u. Jgl. < 18 J., Schizophrenie o. a. psychot. Erkr. in d. Anamnese (auch Familienanamnese), Anamnese von schweren Persönlichkeitsstör. o. a. erheblichen psychiatr. Stör. (außer Depression), Komb. mit starken CYP-3A4-Induk.¹ sollte vermieden werden. Vorsicht u. a. bei Komb. mit sedierenden AM u. Antispastika, Epilepsie. Bei schweren H/K-Erkr. nicht empfohlen.
- NW.** Müdigkeit u. Schwindelanfälle (sh - vorübergehend); (h): Appetitstör., psychiatr. u. nervöse Stör., Sehstör., M/D-Beschw., Stürze
- WW.** Alkohol (u. a. Stürze mgl.), sedierende AM↑, Antispastika (Stürze mgl.), CYP-3A4-Induk.¹(THC/CBD↓), CYP-3A4-Inhib.²(THC/CBD↑)
- MP.** nur zur Anwendung in der Mundhöhle

¹ s.IK² s.IH

Fortsetzung s. nächste Seite