
Dulaglutid



- A.** Subkutane Injektion in Abdomen, Oberarm o. Oberschenkel zu einer beliebigen Tageszeit, unabhängig von d. Mahlzeit
- D.** 1 x wöchentl. 0,75 mg (Monoth.) bzw. 1 x wöchentl. 1,5 mg (Kombinationsth.)
- H.** Nicht i.m. oder i.v. injizieren. Eine versäumte Dosis schnellstmöglich nachholen bzw. auslassen, falls weniger als 3 d bis zur nächsten Injektion verbleiben. Blutzuckerselbstkontrolle bei Kombinationsth. empfohlen. Verzögerte Magenentleerung bei oraler Begleitmedikation beachten. **Bei starken, persistierenden Abdominalschmerzen absetzen (akute Pankreatitis)**
- KI.** Typ-1-Diabetes, diabetische Ketoazidose; keine Erfahr. bei Kdr. u. Jgl. < 18 J., bei schweren Nierenfunktionsstör., schweren gastrointestinalen Erkr. sowie in Schwangerschaft/Stillzeit nicht empfohlen
- NW.** Hypoglykämie (sh - bei Komb. mit Insulin, Glimepirid, Metormin o. Metformin + Glimepirid, h - bei Komb. mit Metformin + Pioglitazon), M/D-Beschw. (sh), Fatigue (h), Sinustachykardie u. AV-Block (h)
Dieses AM unterliegt einer bes. Überwachung - bitte jede NW. melden!
- WW.** Metformin u. Sulfonylharnstoffe u. Insulin (Hypoglykämie), Sitagliptin (D.↑)