
Pyridostigminbromid



- D. Myastenia gravis:** 3-4 x tgl. 60 mg, bis max. 720 mg/d
- KI.** Mechanische Verschlüsse der Verdauungs- und Harnwege, erhöhter Tonus der Brochialmuskulatur (z. B. bei Asthma, spastischer Bronchitis), Entzündungen des Auges (Iritis); strenge Indikationsstellung bei Ulcus ventriculi, dekompensierter Herzinsuffizienz, Myokardinfarkt, Thyreotoxikose u. in d. Schwangerschaft, bes. Vorsicht bei Bradykardie, Diabetes, Niereninsuffizienz, M. Parkinson, nach M/D-Operation.
- NW.** Können Zeichen einer Überdosierung sein: Bradykardie u. Hypotonie, Akkomodationsstör., erhöhte Brochialsekretion, M/D-Beschw., verstärkter Harndrang, Muskelbeschw., Schweissausbrüche, Speichel- u. Tränenfluss; cholinerge Krise mgl. mit zunehmender Muskelschwäche bis zu Lähmung - AM sofort absetzen u. Arzt aufsuchen.
- WW.** Weitere Parasympathikomimetika \uparrow , Morphin u. Derivate (Verstärkung d. parasympathimimetischen W.), depolarisierende Muskelrelaxanzien \uparrow (z. B. Succinylcholin), Atropin (Hemmung d. muskarinerger W.), Methylcellulose u. Kohlekompressen (P \downarrow), Aminoglykosid-Antibiotika u. Polypeptid-Antibiotika u. Clindamycin u. Oxytetracyclin u. Lincomycin u. Chinidin u. Procainamid u. Propranolol u. Penicillamin u. Lithium u. Benzodiazepine u. Phenothiazine u. Cortikosteroide (P \downarrow)