

Etoricoxib



NSAR, selektiver COX-2-Hemmer

- A.** Ohne Nahrung einnehmen, wenn rascher W.-Eintritt erwünscht ist
- D.** **Arthrose:** 1 × tgl. 30(–60) mg
Rheumatoide Arthritis/Spondylitis ankylosans: 1 × tgl. 90 mg
Akuter Gichtanfall: 1 × tgl. 120 mg, max. 8 d
Postoperative Schmerzen nach Zahn-OP: 1 × tgl. 90 mg, max. 3 d
- H.** Niedrigste D. über kürzestmöglichen Zeitraum anwenden wg. Anstieg d. kardiovaskulären Risikos. Regelmäßige Blutdruck- und Leberfunktionskontrolle. Bei Auftreten von Schwindel u. Müdigkeit kann d. Reaktionsvermögen eingeschränkt sein
- KI.** Kdr. u. Jgl. < 16 J.; aktives peptisches Ulcus o. aktive gastrointestinale Blutung, Unverträglichkeit gegenüber ASS, NSAR u. Coxiben; schwere L/N-Funktionsstör., entzündl. Darmerkr., Herzinsuffizienz, Hypertonie (anhaltend > 140/90 mm Hg), koronare Herzkrankheit, periphere arterielle Verschlusskrankheit u./o. zerebrovaskuläre Erkr.; Vorsicht bei Komb. mit ASS (auch in niedriger D.) u. bei gastrointestinalen u. kardiovaskulären Risikopat.
- NW.** (h): Ödeme, Kopfschmerzen u. Schwindel, Palpitationen u. Hypertonie, M/D-Beschw., Hauterkr.
- WW.** ASS (NW↑, in höherer D. nicht empfohlen), orale Antikoagulantien↑, Diuretika u. Antihypertonika↓, Ciclosporin u. Tacrolimus (Nephrotox.↑), Lithium↑, Methotrexat (Tox.↑), orale Kontrazeptiva, Estrogene↑, Digoxin, Salbutamol oral u. Minoxidil, Rifampicin (E.↓)